

การจัดเรียงฟันที่ดีต้องอาศัยทั้งสองทาง

ทันตกรรมจัดฟันรักษาคืออะไร

- ทันตกรรมจัดฟันรักษาเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือปรับแก้เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันและของขากรรไกร



- เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นด้วยวัสดุยึดติดและลวดคือเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันที่ ทันตแพทย์จัดฟันมักใช้บ่อยที่สุด



- ในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตทันตแพทย์จัดฟันอาจใช้เครื่องมือใช้กระตุ้นเพื่อจัดฟันแบบติดแน่นหรือแบบถอดได้เพื่อเพิ่ม การเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร



- ส่วนในผู้ป่วยบางรายที่ไม่อยากนิกการใช้เครื่องมือใช้จัดฟันแบบถอดได้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ได้ผลการรักษาตามที่ต้องการ



ภาวะใดที่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับทันตกรรมจัดฟันรักษา

ภาวะดังต่อไปนี้คือข้อบ่งชี้สำหรับการรับทันตกรรมจัดฟันรักษา


- ฟันซ้อนเกที่ส่งผลต่อรูปร่างหน้าตาและสุขภาพทางสรีรวิทยาของผู้ป่วย มักพบในเด็กและวัยรุ่นมากกว่า



- ฟันที่เรียงตัวไม่ดี ทำให้ทำความสะอาดได้ยาก
คราบจุลินทรีย์และเศษอาหารติดชอกฟันได้ง่าย
ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและโรคเหงือก



- ฟันยื่นหรือฟันสบไขว้



- การสบฟันที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การบาดเจ็บของเหงือกและการเคี้ยวลำบาก



ข้อสงสัยที่พบบ่อย

1. เวลาใดดีที่สุดในการเริ่มต้นทันตกรรมจัดฟันรักษา

ในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ผลการรักษามีแนวโน้มที่จะดีกว่า

ทันตกรรมจัดฟันรักษาในผู้ใหญ่มักใช้เวลามากกว่า

เนื่องจากผู้ใหญ่จะไม่มีกระดูกเจริญเติบโตแล้ว

ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในผู้ใหญ่ก็สูงกว่าเช่นกัน

ทันตแพทย์จัดฟันของท่านจะให้คำแนะนำเรื่องช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษา

2. ทันตกรรมจัดฟันรักษามีความเจ็บปวดหรือไม่

คนส่วนมากมักเกิดอาการปวดตึงหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันเป็นครั้งแรก

หรือหลังจากปรับเครื่องมือในช่วงระหว่างการรักษา

ความเจ็บปวดนั้นคงอยู่ไม่นานและจัดการได้ง่าย

3. ผลข้างเคียงของทันตกรรมจัดฟันรักษามีอะไรบ้าง

อนามัยช่องปากที่ไม่ดีระหว่างรับทันตกรรมจัดฟันรักษาอาจก่อให้เกิดฟันผุ จุดสีขาวขุ่น (แคลเซียมเสื่อมสลาย) และโรคเหงือกตามมาได้

ฟันที่เคยเสียหายจากโรคฟันผุหรือจากการบาดเจ็บอาจกลายเป็นฟันตายได้เมื่อเวลาผ่านไป ฟันที่ตายอาจเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็ได้ระหว่างรับทันตกรรมจัดฟันรักษา ซึ่งทำให้ต้องรักษารากฟัน



4. ฟันของฉันทจะซ้อนเกอีกหรือไม่หลังจากทันตกรรมจัดฟันรักษาสิ้นสุด

ฟันจะเกิดการเคลื่อนที่อยู่เสมอตลอดทั้งชีวิต

การเคลื่อนของฟันส่วนมากจะอยู่ในขอบเขตปกติ

และการสวมใส่รีเทนเนอร์อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

หมายเหตุสำคัญ

ทันตกรรมจัดฟันรักษาเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากอีกทั้งต้องการความร่วมมือและความรับผิดชอบของผู้ป่วยเป็นอย่างดี

- การเคลื่อนของฟันเล็กน้อยเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาตามปกติ
และไม่ใช่ว่าภาวะทั้งหมดจะต้องการหรือได้รับประโยชน์จากทันตกรรมจัดฟันรักษา
- ท่านควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันและทำความเข้าใจถึงความยุ่งยากและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ระหว่างขั้นตอนการรักษาก่อนที่จะตัดสินใจ